











Experiencias en el Manejo de Huertos de Cítricos con Presencia de HLB



Mario Orozco-Santos CE Tecomán. inifap - México orozco.mario@inifap.gob.mx



Campo Experimental Tecomán



EL LIMÓN MEXICANO (Citrus aurantifolia)

Mario Orozco-Santos, Marciano Manuel Robles-González, José Joaquín Velázquezmonrear, miguer Anger Manzanilla-Ramírez, Manuel de Jesús Bermúdez-Guzmán, Silvia Heréndira Carrillo-Medrano, Víctor Manuel Medina-Urrutia, Luis Martín Hernández-Fuentes, Rafael Gómez-Jaimes, Gilberto Manzo-Sánchez, Javier Farías-Larios, Daniel Nieto-Ángel, Edgar Mijangos-Hernández, Julio Alejandro Sánchez-de la Torre y Sóstenes Varela-Fuentes







Centro de Investigación Regional Pacífico Centro Campo Experimental Tecomán Tecomán, Colima, México, Noviembre de 2014

Libro Técnico Num. 1, ISBN: 978-607-37-0389-5

CÍTRICOS

SOUTHWESTERN ENTOMOLOGIST VOL. 47, NO. 4

DEC. 2022

Uso de Acolchados Plásticos para Reducir Diaphorinia citri¹-Huanglongbing e Incrementar el Rendimiento de Lima Mexicana en el Trópico Seco de México

Use of Plastic Mulch to Reduce Diaphorina citri'-Huanglongbing and Increase Mexican Lime Yields in the Dry Tropic of Mexico

Mario Orozco-Santos², José Concepción García Preciado², José Joaquín verazquez-monrear-, Luis Martín Hernández-Fuentes³, Marciano Manuel Robles-González², Miguel Ángel Manzanilla-Ramírez², v Gilberto Manzo-Sánchez⁴

Resumen. El Huanglongbing (HLB) es transmitido por el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri) y afecta severamente las plantaciones comerciales de lima mexicana (Citrus aurantifolia) en la región tropical seca de México. El manejo del Huanglongbing se basa en el uso intensivo de prácticas agronómicas, como riego, nutrición, Poda, y control de maleza, plagas, y enfermedades. Durante 2018 a 2022, se evaluó el efecto de acolchados plásticos de color negro, blanco, y aluminio en comparación con una malla de polipropileno blanca (ground cover) y suelo desnudo (sistema tradicional), sobre la población de D. citri y la incidencia-severidad (I-S) de Huanglongbing, así como el rendimiento de lima mexicana. Los árboles con todos los tipos de acolchado plástico reduieron la I-S durante los primeros 13 meses del estudio (35 a 40% del follaje afectado) en comparación con el suelo desnudo (74% de la afectación de los árboles). Además, las parcelas con los acolchados tuvieron menos adultos del psílido asiático de los cítricos (1 a 16 insectos/trampa/semana) en comparación con el suelo desnudo (11 a 28 adultos). Los tratamientos con acolchado tuvieron un efecto positivo en el rendimiento de fruta. Después de cuatro años, las parcelas con plástico blanco, aluminio, verde y negro produjeron 41.6, 40.1, 39.7, y 34.9 t/ha. El suelo desnudo produjo sólo 26.6 t/ha. El costo de instalar estos acolchados plásticos fue de 526 dólares/ha. Considerando que los plásticos aumentaron los rendimientos en un 50-57% y el precio promedio de la fruta de lima mexicana fue de 600 dólares/t, este sistema de producción es una alternativa viable para los productores para coexistir con el HLB en el trópico seco de México.

Abstract. Huanglongbing (HLB) vectored by Asian citrus psyllid (Diaphorina citri) severely affects commercial plantations of Mexican lime (Citrus aurantifolia) in the dry tropic region of Mexico. Management of Huanglongbing is based on intensive use of agronomic practices such as irrigation, nutrition, pruning, and weed, insect pest,

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Tecomán, Km 35 carretera Colima-Manzanillo, Tecomán, Colima, México CP 28100.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Santiago Ixcuintla, Km 6, entronque a Santiago Ixcuintla, carretera internacional México-Nogales, Santiago Ixcuintla, Navarit, México CP 63300.

⁴Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Colima, Km. 40 carretera Colima Manzanillo, Tecomán, Colima, México CP 28100.

*Corresponding autor: orozco.mario@inifap.gob.mx

MANEJO INTEGRADO DE MALEZA **EN LIMÓN MEXICANO**

Mario Orozco-Santos Karina de la Paz Garcia-Mariscal



Centro de Investigación Regional Pacifico Centro Campo Experimental Tecomán Tecomán, Colima, México Folleto Técnico No. 26

AGRICULTURA | inigap

Noviembre 2023 ISBN: 978-607-37-1586-7 Núm. de Registro de Obra: 03-2023-112808432100-01

orozco.mario@inifap.gob.mx orozco_santos@yahoo.com



644,180 ha





Naranja: 353,342 ha



Limón persa: 114,166 ha



Limón mexicano: 104,520 ha



Otros cítricos: 21,855 ha

Fuente: SIAP 2024

HLB: Amenaza para la citricultura mundial



HLB Factores Involucrados en su Importancia



Distribución

Amplia

Localizada



Daños


Vigor del árbol Calidad del fruto Producción



Recursos para su combate Medidas legales Insumos Investigación Sustentabilidad




N T O M A S





S Í N T O M AS







IMPACTO DEL HLB

CÍTRICOS DULCES



- Síntomas en frutos
- Afecta calidad del fruto



- Caída de frutos
- Pérdida gradual de rendimiento



- Reducción de la vida productiva
- Muerte productiva de árboles

CÍTRICOS ÁCIDOS



No síntomas en frutos



No afecta calidad del fruto (tamaño)



- Avance gradual en el follaje
- Pérdida gradual de rendimiento



- Reducción de la vida productiva
- No muerte de árboles

EFECTOS EN CÍTRICOS inifap



HUANGLONGBING (HLB)

- Fisiología del árbol
- Desbalance nutricional
- Desbalance de fitohormonas
- Afecta el sistema radicular
- Taponamiento de vasos
- Reducción gradual del rendimiento
- Reducción de la vida productiva del árbol









2002 Campeche

inifap

CASO: COLIMA, MÉXICO



PRIMERA HUERTA COMERCIAL CON HLB EN MÉXICO





CULTIVO: Lima mexicana (*Citrus aurantifolia*)

PATRONES: Citrus macrophylla (80%) y C. volkameriana (20%)

LOCAL ZACION: 10 msnm. 500 m del mar. Mpio. de Tecomán

EDAD: 4 años


SUPERFICIE DE LA HUERTA: 15 hectáreas

RENDIMIENTO: Más de 30 toneladas por hectárea



HUERTA 'LUCY': Abril 2010






Croquis 2,909 plantas (5 árboles positivos: 0.17%)


HLB, confirmados por PCR.

(Fuente: Robles et al., 2013)

HUERTA 'LUCY': Julio 2010

inifap






(Fuente: Robles et al., 2013)

HUERTA 'LUCY': Abril 2011 (12 meses)






(Fuente: Robles et al., 2013)



COLIMA



Millones de árboles afectados por HLB



ACCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL



- Utilizar planta proveniente de viveros certificados (plantas producidas bajo casas de malla) en replantes y nuevas plantaciones;
- Control del vector, que incluya la aplicación de productos químicos autorizados por la COFEPRIS para el uso específico;
- Realizar al menos 4 monitoreos por año para la detección del HLB.
 Los resultados deberán ser informados dos veces al año al Comité
 Estatal de Sanidad Vegetal, quien los concentrará y remitirá al SENASICA.
- Eliminar, en un plazo de 5 días, todos los árboles con síntomas de HLB que sean detectados en los monitoreos, y
- Eliminar, en un plazo de 5 días naturales, la totalidad de los árboles de la huerta cuando en un monitoreo se detecte que, al menos, el 28% de las plantas presentan síntomas de HLB. Lo anterior, para evitar focos de infección para el resto de las huertas productoras de cítricos.

CASO LIMÓN MEXICANO (COLIMA)


OFRECER ALTERNATIVAS O SOLUCIONES AL PRODUCTOR

ERRADICAR O NO?











CASO PICUDO DEL ALGODÓN EN ALABAMA. CAMBIO A CACAHUATE Y OTROS CULTIVOS.
MONUMENTO AL PICUDO COMO SIMBOLO DE PROSPERIDAD (Enterprise, Alabama)

CASO DE ESTUDIO



HLB en el Campo Experimental Tecomán-INIFAP, Colima. **Mayo de 2011**







1,171 árboles 4 árboles (0.34%)

Fuente: Dr. Joaquín Velázquez

HLB en el Campo Experimental Tecomán-INIFAP, Colima. **Julio de 2012 (14 meses)**



Fuente: Dr. Joaquín Velázquez


930 árboles (79.4%)








HLB Y SU IMPACTO EN LIMÓN MEXICANO



ERRADICACIÓN ESTRATEGIA BRASILEÑA PLANTAS CONTROL VECTOR SANAS



MANEJO AGRONÓMICO




CONTROL VECTOR

PLANTAS SANAS





MANEJO AGRONÓMICO




CONTROL VECTOR

PLANTAS SANAS



MANEJO AGRONÓMICO DE LOS CÍTRICOS BAJO UN ESCENARIO DE HLB





MANEJO SOSTENIBLE

AS BUENAS PRÁCTICAS ACRÍCOLAS son una serie de principios y recomendaciones económicamente factibles y aplicables a las diversas etapas de la producción agrícola, incluyendo empaque y transporte, con el objeto de ofrecer al mercado un producto inocuo y de buena calidad, previniendo contaminaciones químicas, físicas y de organismos patógenos para los consumidores.

















DENSIDADES DE PLANTACIÓN





DENSIDADES TRADICIONALES (10 x 10 M)

- Bajos rendimientos
- Deficiente aprovechamiento de suelo (tiempo y espacio)

ALTAS DENSIDADES

- Aprovechamiento del suelo y mayor volumen de copa productiva.
- Incremento en rendimiento.
- Rentabilidad y rápida recuperación de la inversión.
- Requiere un manejo más intensivo



NARANJAS





COSTA RICA (7 x 1.5 m: 952 plantas/ha)

SUDÁFRICA (4 x 2 m: 1,250 plantas/ha)

FLORIDA (6 x 2.5 m: 666 plantas/ha)











RODADO O INUNDACIÓN



GOTEO







MICROASPERSIÓN

MANEJO AGRONÓMICO





MANEJO


- Salud del suelo
- Riego y Nutrición
- Poda
- Control: maleza, plagas y enfermedades







Física Química Biológica



MATERIA ORGÁNICA

- Composta, reguladores
 pH, mejoradores
- Humus de lombriz
- Lixiviados, bioles, etc.

FLORA MICROBIANA

- Bacterias PC
- Micorrizas
- Otros hongos
- Protozoarios

Rizósfera

INTERACCIÓN DE MICROORGANISMOS CON RAÍCES Y SUELO PARA CREAR UN ENTORNO BENÉFICO PARA LAS PLANTAS. LOS EXUDADOS RADICULARES ATRAEN LOS MICROORGANISMOS BENÉFICOS. SE MEJORA LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES

SALUD DEL SUELO

(CAPACIDAD DEL SUELO DE FUNCIONAR COMO UN SISTEMA VIVO)
(FAO, 2011)



NUTRICIÓN ORGÁNICA











BENEFICIOS DE LA NUTRICIÓN ORGÁNICA

- Mejora la calidad de los frutos
- Aumenta la resistencia a enfermedades
- Protege el medio ambiente
- Incrementa la biodiversidad
- Mejora la fertilidad del suelo
- Incrementa la flora microbiana (ANTAGONISTAS)
- Reduce el uso de fertilizantes químicos (manejo sostenible)

NUTRICIÓN



La nutrición vegetal es el conjunto de procesos mediante los cuales las plantas toman sustancias del exterior para sintetizar sus componentes celulares o usarlas como fuente de energía. Las plantas son capaces de fabricar su propio alimento. Para ello, necesitan agua, sales minerales, oxígeno y luz del sol. Las sales minerales las toman del suelo o vía foliar.





- Mejoramiento de la fertilidad del suelo (Química, Biológica y Física)
- Uso de herramientas de diagnóstico
 - Análisis de suelo
 - Análisis foliar
 - Análisis de solución de suelo
 - Análisis de agua
- Suministro de nutrientes (macro y micro) y agua de riego oportuna y suficiente
- Uso de reguladores de pH para agua y suelo

FERTILIZACIÓN

















PODA DE MANTENIMIENTO

ALTAS DENSIDADES DE PLANTACIÓN











FITOSANIDAD



- Se refiere a la protección de los cultivos agrícolas (CÍTRICOS) contra las organismos dañinos (PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZA) que afectan su salud y productividad.
- La fitosanidad es crucial para garantizar la seguridad alimentaria, proteger el medio ambiente y mantener la viabilidad económica de la producción agrícola.



ESTRATEGIAS PARA LA FITOSANIDAD





Manejo Integrado de Plagas (MIP)



Control Biológico



Control Cultural



Control físico



Control genético




Control químico

- Enfoque integral
- Manejo sostenible
- Protección del cultivo
- Producción de alimentos
- Viabilidad económica



MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

El MIP es una estrategia sostenible para el manejo de plagas y enfermedades con la combinación de herramientas de control biológico, orgánico, cultural, etológico, mecánico, físico y químico con el propósito de minimizar los riesgos económicos, de salud y ambientales





La pirámide del MIP es un enfoque estructurado para manejar plagas de manera efectiva y sostenible. La pirámide se basa en una jererquía de estrategias de control, priorizando métodos que son menos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.

Químico

Mecánico

Físico

Biológico - Etológico

Prevención - Cultural - Genético





Insecticidas, fungicidas y herbicidas químicos autorizados.

Insecticidas biorracionales (extractos vegetales - aceites) y bioherbicidas /

Rastreo, podas mecánicas, deshierbes con desbrozadora

Acolchados, trampas, cintas reflejantes

Biológico: *Tamarixia*, entomopatógenos, crisopa, etc/ Podas, riegos, fertilización, variedades Químico

Mecánico

Físico

Biológico - Etológico

Prevención - Cultural - Genético





PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS

CICLO DE VIDA











2 A 5 DÍAS

8 A 17 DÍAS







10 A 76 DÍAS









Manejo Integrado de Diaphorina-HLB



- Conocimiento del patosistema
 - Enfermedad

 Vector
 - HospederoClima
- Prácticas y Acciones
 - Monitoreo de vector
 - Monitoreo (erradicación de árboles)
 - Manejo agronómico
- Material certificado
 - Plantas sanas
- Control químico, alternativo y/o biológico
 - Control del vector

Control de Diaphorina

MONITOREO



APLICACIÓN DEQUÍMICOS Y/OALTERNATIVOS



El monitoreo sirve para la toma de decisiones de control



Control de Diaphorina

- Plaga (s) objetivo: Diaphorina
- Fenología del huerto
- Alternativas de control
- Producto a utilizar ()
- Momento de aplicación
- Éxito sobre Diaphorina
- Efectos secundarios sobre benéficos
- Aparición de otras plagas
- Riesgo de resistencia

Control de Diaphorina

QUÍMICOS

- Neonicotinoides
- Organofosforados
- Piretroides
- Sulfoxaminas
- Avermectinas
- Butenolides
- Derivados Ac.Tetrámico

ALTERNATIVOS

- Aceites parafínicos
- Extractos vegetales
- Jabón potásico
- Caldo sulfocálcico
- Jabones



Control biológico

Tamarixia

Olla v-nigrum
Chrysoperla Sp.
Ceraeochrysa sp.
Cycloneda sp

Chilocorus sp

Hirsutella citriformis Verticillium lecanii Beauveria Metarhizium Lecanicillium















MÉTODOS DE CONTROL







QUÍMICO



ALTERNATIVAS AGROECOLÓGICAS



Bioherbicidas



Control mecánico



Cultivos de cobertera



Control manual



Acolchados orgánicos



Acolchados plásticos



Herbicidas en cítricos

Ir	ngrediente activo	Tipo	Producto comercial	Dosis/ha
Р	araquat	Contacto	Gramoxone Ojiva	2 a 3 l
	araquat + Diurón	Contacto + Preemergente	Gramocil	2 a 3 l
G	Glifosato trimesium	Sistémico	Coloso total 360	2 a 4 l
G	Blifosato	Sistémico	Yerbimat Faena Glifosato 360 SL	2 a 4 l
G	Slufosinato de amonio	Contacto	Finale	1.5 a 3.0 l
D	iurón	Preemegente	Karmex	2.0 a 4.0 kg
Т	rifluralina	Preemegente	Trifluralina 480	1.2 a 2.4 l
(Ir	ndaziflam	Preemegente	Alion	150 a 200 ml

MÉTODO COMBINADO









CONTROL MECÁNICO

USO DE DESVARADORA







DESVARADORA MODIFICADA









Enfermedades

- Gomosis o pudrición del pie
- Cancer basal
- Antracnosis
- Mancha grasienta
- Melanosis

Fund it a EDADES Rona dei naranjo agrio y dulce

- Mancha café por Alternaria
- Algas y Mohos del fruto
- Muerte de ramas
- Wood pocket
- Nematodos
- HLB, Tristeza, Leprosis
- Exocortis, Psorosis
- Cancrosis, Mancha negra y CVC





- HLB no se puede controlar
- Solo con el Plan A y Plan B
- Para el Plan A:
 - Organización de productores
 - Efecto vecino
 - Cero tolerancia con el vector
- Para el Plan B:
 - Convivencia con el HLB
 - Manejo agronómico intensivo
 - Manejo del vector


PRODUCCIÓN EN ACOLCHADO



RENDIMIENTO ANUAL (TON/HA) LIMÓN MEXICANO

Tratamientos	Rendimiento (t/ha)				
	2do año	3er año	4o año	5o año	
Negro	2.6	15.7	16.6	5.5	
Blanco	3.6	19.1	18.9	7.2	
Aluminio	4.3	17.7	18.1	9.0	
Verde	2.8	18.8	18.0	9.0	
Groud cover	2.4	17.7	19.8	10.1	
Suelo desnudo	1.3	9.6	15.7	8.9	

RENDIMIENTO ACUMULADO (TON/HA) (A LOS 4 AÑOS + 3 MESES)



BENEFICIOS Recuperación de la inversión Preceded y productividad Menor incidencia y severidad de HLE Repelencia a insectos Conservación de humedad. Control de maleza Aumenta temperatura de suelo. Mayor vigor de los árboles Copa productiva

RENDIMIENTO (TON/HA) (A LOS 2 AÑOS + 6 MESES)

Densidad de plantación (árboles/ha)	Volumen de copa (m³/ha)	Rendimiento (Ton/ha)	Utilidad bruta (\$)
6 x 3 m (555) 'Lise'	16,994a	15.3 a	155,861
6 x 4 m (416) 'Lise'	14,902 b	11.5 b	116,825
6 x 5 m (333) 'Lise'	10,247b	9.2 bc	93,516
5 x 3.5 m (571) 'Lise'	17,484 a	15.8a	160,354
8 x 5 m (250) 'Lise'	7,068 c	6.9 c	70,207
8 x 5 m (250) 'Colimex'	6,837c	7.9 c	69,006







HLB: NO HAY CONTROL



BIOCONTROL Y BIOESTIMULANTES



Inyecciones al tronco (antibióticos) (Albretch, 2020)



Peptidos antimicrobiales de *Microcitrus* (Huang *et al*, 2021)



Inductores de defensa (ácido salicílico, análogos y brasinoesteroides



Bioestimulantes (Productos a base del alga *Ascophyllum nodosum*). Experiencias: Florida y México.











Gracias

Mario Orozco Santos orozco.mario@inifap.gob.mx













